

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES RIAU  
PROGRAM STUDI D IIV KEBIDANAN**

**SKRIPSI, MEI 2021  
SRI RAHAYU**

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN  
*STUNTING* PADA BALITA USIA 2–5 TAHUN DI KELURAHAN  
TANJUNG RHU WILAYAH KERJA PUSKESMAS LIMA PULUH  
PEKANBARU TAHUN 2021**

**± 91 Halaman, 8 Tabel, 2 Bagan, 11 Lampiran**

---

---

**ABSTRAK**

*Stunting* menjadi salah satu permasalahan gizi yang dihadapi di dunia, khususnya di Negara-negara miskin dan berkembang. Terdapat beberapa penyebab *stunting* salah satunya yaitu pola asuh. Kebiasaan yang ada di dalam keluarga berupa praktik pemberian makan, rangsangan psikososial, praktik kebersihan/hygiene, dan pemanfaatan pelayanan kesehatan mempunyai hubungan yang signifikan dengan kejadian *stunting*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian *stunting* pada balita usia 2–5 tahun di Kelurahan Tanjung Rhu Wilayah Kerja Puskesmas Lima Puluh Pekanbaru 2021. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai Mei Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain *cross sectional*. Sampel pada penelitian ini sebanyak 69 balita, yang diambil dengan teknik *Proportionate Stratified Random Sampling*. Analisis menggunakan uji *Chi-Square*. Hasil penelitian menunjukkan 79,7% Balita dengan status gizi kategori normal, 71% praktik pemberian makan pada anak Balita dengan kategori baik, 58% rangsangan psikososial dengan kategori baik, 82,6% praktik kebersihan/hygiene dengan kategori baik, 63,8% pemanfaatan pelayanan kesehatan dengan kategori baik. Hasil uji *Chi-Square* diketahui bahwa ada hubungan praktik pemberian makan ( $P = 0,000$ ), rangsangan psikososial ( $P = 0,013$ ), praktik kebersihan/hygiene ( $P = 0,000$ ), pemanfaatan pelayanan kesehatan ( $P = 0,000$ ) dengan kejadian *stunting*. Diharapkan kepada tenaga kesehatan khususnya bidan agar lebih optimal dalam melakukan penyuluhan tentang praktik pemberian makan, rangsangan psikososial, praktik kebersihan/hygiene, dan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh orang tua atau pengasuh untuk mencegah terjadinya peningkatan prevalensi *stunting*.

**Kata Kunci : Praktik Pemberian Makan, Praktik Kebersihan/Hygiene,  
Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan, *Stunting***

**Referensi : 42 Referensi (2010–2020)**

**MINISTRY OF HEALTH, REPUBLIC OF INDONESIA  
POLYTECHNIC OF HEALTH, RIAU  
STUDY PROGRAM D IV OF MIDWIFERY**

**SCRIPT, MEI 2021  
SRI RAHAYU**

**FACTORS RELATED TO *STUNTING* EVENTS IN TODDLERS AGED 2-5  
YEARS IN TANJUNG RHU SUBDISTRICT, WORKING AREA OF  
PUSKESMAS LIMAPULUH PEKANBARU IN 2021**

**± 91 Pages, 8 Tables, 2 Charts, 11 Appendix**

---

---

**ABSTRACT**

Stunting is one of the nutritional problems faced in the world, especially in poor and developing countries. There are several causes of stunting, one of which is foster care patterns. Habits in the family in the form of feeding practices, psychosocial stimuli, hygiene practices, and the utilization of health services have a significant relationship with stunting events. The purpose of this study is to find out the factors related to stunting events in toddlers aged 2-5 years in the Village Tanjung Rhu Working Area Puskesmas Fifty Pekanbaru 2021. This research was conducted in January to May years 2021. This research uses a type of quantitative research with cross sectional design. The sample in this study was 69 toddlers, which was taken with Proportionate Stratified Random Sampling technique. Analysis using the Chi-Square test. The results showed 79.7% of toddlers with normal category nutritional status, 71% of feeding practices in toddlers with good category, 58% psychosocial stimuli with good category, 82.6% hygiene practices with good category, 63.8% utilization of health services in good category. Chi-Square test results are known that there is a relationship of feeding practices ( $P = 0.000$ ), psychosocial stimuli ( $P = 0.013$ ), hygiene practices / higyene ( $P = 0.000$ ), utilization of health services ( $P = 0.000$ ) with stunting events. It is expected to health workers, especially midwives, to be more optimal in counseling about feeding practices, psychosocial stimuli, hygiene/hygiene practices, and the use of health services by parents or caregivers to prevent the occurrence of increased prevalence of stunting.

**Keywords : Feeding Practices, Hygiene/Hygiene Practices, Utilization of Health Services, *Stunting*.**

**References : 42 References (2010–2020)**